

Ehdotus - Jalostustoimikunnan työohjeet bedlingtoninterriereille

Suosituksset jalostuskoirille ja yhdistelmille

YLEISTÄ

Yhdistelmää suunniteltaessa pyritään ottamaan huomioon yksilöiden luonne- ja käyttöominaisuudet, perinnölliset sairaudet ja viat, sekä ulkomuodolliset seikat. Jalostusarvoa määritettäessä kiinnitetään huomiota koiran oman laadun lisäksi myös sen sukulaisten ja jälkeläisten laatuun. Työohjeen yleisperiaatteet ovat vähimmäisvaatimuksineen jalostustoimikunnan runkona ja ohjearvona, kuitenkin niin, että kukin tapaus käsitellään yksilöllisenä ja harkinnan mukaan voidaan näistä ohjeista joustaa tai niitä tarvittaessa tiukentaa. Työryhmän päätös koskee ainoastaan sitä astutuskertaa, johon tiedustelu kohdistuu.

SUOSITUKSET JALOSTUKSEEN KÄYTETTÄVIEN KOIRIEN JA YHDISTELMIEN OMINAISUUKSISTA

PEVISA-ohjelmaan liitetyt sairaudet:

Kuparitoksikoosi

1. Mahdollisimman monelle koiralle pyritään saamaan tulos suorasta COMMD-1 geenitestistä, ainakin siihen asti kun mahdollinen toinen kuparitoksikoosimutaatio on löydetty ja sille on saatu geenitesti. Kasvattajille suositellaan kaikkien pentujen testaamista.
2. Kahta kantajaa ei saa yhdistää, eikä geneettisesti sairaan koiran jälkeläisiä rekisteröidä.
3. Sairastuneista koirista mutaatio varmistettaisiin geenitestillä. Sairaista koirista, joista ei löydy COMMD-1 mutaatiota tai kytkentää siihen, toivotaan lähetettävän DNA-näyte kuparitoksikoosia tutkiville ryhmille. Yhteystiedot saa Suomen Bedlingtonkerholta ja internetilinkit ovat JTO:n liitteenä.
4. Suositellaan, että kaikilta jalostukseen käytettäviltä koirilta tutkitaan maksa-arvo ALAT (alaniiniaminotransferaasi) verinäytteestä ennen astutusta. Suositellaan jalostukseen käytettäväksi vain koiria, joilla ALAT-arvo on viiterajojen sisällä tai mikäli ALAT-arvo on tai on ollut koholla, nousun on todettu eläinlääketieteellisissä tutkimuksissa tai eläinlääketieteellisen asiantuntijarvion perusteella johtuvan/johtuneen ei-perinnöllisestä syystä.

Silmäsairaudet

1. Perinnölliseen kataraktaan eli kaihiin sairastunutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
2. Lisäksi koira, jolla on lasiaisen rappeutuma, puuttuva kyynelkanavan aukko, oireeton distichiasis/trichiasis, lievä PPM, mRD, PHTVL/PHPV aste 1 suositellaan yhdistettäväksi vain näiden sairauksien suhteen terveen parituskumppanin kanssa.

Muu terveys:

Päkiänkovettuma

Suosittelaaan, että koirat, joiden suvussa on esiintynyt hyperkeratoosia, testataan ennen jalostuskäyttöä. Geenitesti on saatavilla Animal DNA Diagnostics, Antagene ja Laboklin laboratorioista. Geenitestin tulos on: 1. terve- ei kantaja, 2. terve - kantaja, 3. sairas – periyttää aina. Sairaita koiria ei tulisi käyttää jalostukseen. Kantajalle tulisi käyttää vain geneettisesti terveeksi todettua parituskumppania.

Atopiat ja allergiat

Atooppista ja allergista koira ei tulisi käyttää jalostukseen.

Työryhmän tulee seurata muidenkin kuin edellä mainittujen perinnöllisten sairauksien ja vikojen esiintymistä rodussa ja tarvittaessa ryhtyä niiden edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muut jalostussuositukset:

Luonne ja käyttäytyminen

Suosittelaaan, että jalostukseen käytettävillä koirilla on jokin Kennelliiton yleisen jalostustrategian edellyttämä luonteen/käyttäytymisen arvio/kartoitus:

- luonnetesti
- MH-luonnekuvaus
- käyttäytymiskoe (BH)
- Kennelliiton virallisen jalostustarkastuksen käyttäytymisen arviointi
- näyttelyarvostelu, jossa rodunomaisen käyttäytymisen arvio

Arkaa tai aggressiivista koira ei tulisi käyttää jalostukseen. Koira, joka kärsii eroahdistuksesta, ei suositella jalostukseen.

Suositus yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärälle

Enimmäismäärä jälkeläisiä 10 pentua 7 ikävuoteen mennessä, tervettä jälkeläisnäyttöä omaavaa yli 7- vuotiasta urosta voi tämän jälkeen käyttää harkiten jalostukseen.

Yleisen ohjeen mukaan koiran elinaikainen jälkeläismäärä on enintään 5 % rodun neljän vuoden rekisteröintimääristä. Urosten jälkeläismäärän tulee jakautua mahdollisimman tasaisesti eri vuosille

Ulkomuoto

Suositus on, että jalostukseen käytettävien koirien tulisi saavuttaa vähintään näyttelypalkinto H (hyvä), jos koira käytetään jalostukseen useammin kuin kerran, olisi palkintosijan oltava vähintään EH (erittäin hyvä) tai ERI (erinomainen). Vaihtoehtoisesti koira pitäisi olla jalostustarkastettu.

KASVATTAJAA KOSKEVIA SITOUMUKSIA

Kasvattajan tulee toimia kasvatustyössään Suomen Kennelliiton ja Suomen Terrierijärjestö r.y.:n yleisten toimintaperiaatteiden mukaisesti.